

MEDICAMENTO	INDICACIONES	FORMA DE PRESENTACIÓN
TRATAMIENTO DE BLEFARITIS CRÓNICA (DEMODEX)		
Óxido amarillo de mercurio 2 % Ungüento tópico.	Tratamiento de blefaritis crónica causada por el ácaro <i>Demodex</i> . Tratamiento local de infecciones menores de los ojos.	10 g
INMUNOSUPRESOR		
Ciclosporina 1% a 2% Colirio.	Para prevenir el rechazo de trasplante de córnea o en procesos autoinmunes como uveítis endógena, queratoconjuntivitis primaveral, etc.	3 ml
AGENTE ISOTÓNICO		
Solución Isotónica 0.9% Colirio (NaCl al 0.9%).	Solución estéril de limpieza ocular	10 ml
TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DEL OJO SECO		
Acetilcisteína 5 % y 10 % Colirio.	Síndrome del ojo seco (queratoconjuntivitis seca, queratitis seca o xerofthalmia) asociado a deficiencia de secreción lagrimal o producción anormal de moco, como mucolítico. Como tratamiento para conjuntivitis primaveral y en quemaduras químicas inhibiendo la colagenasa.	10 ml
Tacrolimus 0.02 % Ungüento oftálmico.	Queratoconjuntivitis seca. Conjuntivitis alérgica. Dermatitis atópica moderada a grave, dermatitis por contacto y tóxica.	10 g
Tacrolimus 0.03 % Colirio	Queratoconjuntivitis seca. Conjuntivitis alérgica. Dermatitis atópica moderada a grave, dermatitis por contacto y tóxica.	5 ml
Ciclosporina 0.05 % Colirio.	Queratoconjuntivitis seca. Inflamación en superficie ocular.	5 ml
TRATAMIENTO DE ROSÁCEA OCULAR		
Metronidazol 0.75 %, 1% y 2% Ungüento tópico.	Tratamiento tópico de rosácea ocular y facial.	10 g
ANTIBIÓTICOS		
Metronidazol 0.5 % Colirio.	Bactericida, amebicida y antiprotozoario, usado principalmente en el tratamiento de infecciones por anaerobios, amebas y protozoos, particularmente contra <i>Trichomonas sp.</i>	5 ml
Azitromicina 1 % Suspensión oftálmica.	Macrólido indicado para el tratamiento de blefaritis y conjuntivitis bacteriana causada por los siguientes microorganismos susceptibles: <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus mitis</i> y <i>Streptococcus pneumoniae</i> .	5 ml
ANTIBIÓTICOS FORTIFICADOS		
Amikacina 2.5 % y 5 % Colirio.	Aminoglucósido, útil en queratitis bacteriana, infecciones oculares y úlceras corneales causadas por gérmenes sensibles (gram negativos).	5 ml
Cefazolina 133mg/ml y 5 % Colirio.	Cefalosporina de primera generación, activa contra cocos gram positivos (<i>Staphylococcus</i> y <i>Streptococcus</i>). Útil en infecciones oculares y úlceras corneales causadas por gérmenes sensibles.	5 ml
Ceftazidima 5 % Colirio.	Cefalosporina de tercera generación con especial actividad contra <i>Pseudomonas</i> , se puede emplear para el tratamiento de endoftalmitis infecciosa y de infecciones oculares superficiales como conjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis, blefaritis, blefaroconjuntivitis, úlceras corneales, etc., causadas por microorganismos sensibles.	5 ml
Ceftriaxona 5 % Colirio.	Cefalosporina de tercera generación, con un amplio espectro de acción contra bacterias gram positivas y gram negativas aerobias.	5 ml
Cefuroxima 5 % Colirio.	Cefalosporina de segunda generación con un espectro antibacteriano medio, con acción más marcada sobre las bacterias gram negativas aerobias, se ha empleado para el tratamiento de conjuntivitis mixta (<i>Haemophilus influenzae</i> y <i>Branhamella catarrhalis</i>), conjuntivitis subaguda, proflaxis de endoftalmitis posterior a la extracción de cataratas.	5 ml

MEDICAMENTO	INDICACIONES	FORMA DE PRESENTACIÓN
Vancomicina 31mg/ml, 2.5 % y 5 % Colirio.	Glucopéptido activo frente a <i>Staphylococcus</i> , <i>Streptococcus</i> Grupo A alfa-hemolíticos y <i>Streptococcus pneumoniae</i> , entre otros. Se usa ampliamente en infecciones oculares y queratitis bacteriana en las que se sospecha de gram positivos y microorganismos sensibles.	5 ml
CITOSTÁTICO		
Mitomicina 0.02 % Colirio.	Fármaco que inhibe selectivamente la síntesis de ADN; utilizado en la prevención de la recidiva del pterigión posterior a la cirugía. También puede ser usada para prevenir la cicatrización post-operatoria de fístula abierta en cirugías de glaucoma; posterior a la trabeculectomía para tratar la hipotonía persistente, y como tratamiento de melanoma conjuntival y queratoconjuntivitis.	3 ml
AGENTE HIPEROSMÓTICO		
Solución Hipertónica 5 % Solución oftálmica (NaCl al 5%)	Terapia adjunta para reducir el edema de córnea de etiología variada, incluyendo queratitis bullosa.	10 ml
TRATAMIENTO DE QUEMADURAS OCULARES		
EDTA disódico 0.35 % Solución oftálmica.	Inhibe la formación de colagenasa que ocurre en las quemaduras químicas e impide la acción enzimática sobre el estroma corneal. También es usado como quelante de iones calcio en opacidades de la córnea en que existe depósito de este ión.	10 ml
ANTIMICÓTICO		
Natamicina 5 % Suspensión oftálmica.	Antifúngico usado en el tratamiento de blefaritis, conjuntivitis, y queratitis fúngica, incluyendo la queratitis por <i>Fusarium solani</i> . Presenta actividad contra una variedad de hongos filamentosos y levaduras.	10 ml
Anfotericina B 1 % Solución oftálmica.	Antibiótico antifúngico usado en el tratamiento de infecciones oftálmicas y úlceras corneales causadas por hongos o levaduras.	5 ml
Fluconazol 0.2 % Colirio.	Antimicótico de amplio espectro, activo contra <i>Candida</i> , <i>Cryptococcus</i> , <i>Microsporum</i> y <i>Coccidioides</i> . Se tiene poca evidencia en cuanto a su eficacia en el tratamiento de infecciones micóticas causadas por <i>Aspergillus</i> y <i>Fusarium</i> .	5 ml
ANTIVIRAL		
Ganciclovir 0.15 % Colirio.	Útil para el tratamiento de conjuntivitis adenoviral y queratitis herpética aguda.	5 ml



Botica
MAGISTRAL

Le agradeceremos nos consulte sobre cualquier medicamento oftálmico y/o concentración adicional a los indicados en este VADEMÉCUM.

Nuestra área técnica se encargará de responderle sobre la factibilidad de su preparación.

📞 Celular y Whatsapp: 999 901 467

☎ 01 489 9381

📍 Calle Pirandello 303 Urb. San Borja Sur - San Borja
(Altura cdra. 29 Av. Aviación)

✉ informes@boticamagistral.pe

www.boticamagistral.pe

